DEPSEC
Departamento de Processos Seletivos e Concursos

UNIFAP

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

CONCURSO PARA OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 2004

NÍVEL SUPERIOR
OFICIAL MÉDICO BM
OFICIAL MÉDICO PM

Em 04 de janeiro de 2004

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS

1. Confira se este caderno contém 60 (sessenta) questões, distribuídas conforme o quadro abaixo:

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	20
Conhecimentos Específicos	40

2. Verifique se não há imperfeições gráficas. Caso exista algum problema, comunique, imediatamente, ao Fiscal.

3. Em cada questão há **APENAS UMA** resposta certa.

4. Confira se o seu nome e o seu número de inscrição constam no Cartão de Respostas que você recebeu. Não o dobre e nem o amasse.

5. Assine o verso do seu Cartão de Respostas, conforme a assinatura que consta no seu documento de identidade.

6. Esta prova terá a duração máxima de quatro horas, tendo seu início às 8h e término às 12h.

7. Para preenchimento do Cartão de Respostas, o candidato só poderá utilizar caneta esferográfica azul ou preta e lápis preto nº 2, não podendo pedir emprestado e nem emprestar material.

8. O candidato que sair antes das 10h e 30min deverá, **obrigatoriamente**, devolver todo o material desta prova ao Fiscal. Após este horário, será permitido levar o boletim de questões.

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

PRONOMINAIS

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da nação brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.

(Andrade, Oswald)

1. Sobre o texto, é correto afirmar que

(A) ele pode ser utilizado para mostrar que a Língua Portuguesa não é homogênea.
(B) somente na escrita, o povo brasileiro emprega corretamente os pronomes átonos.
(C) os quatro primeiros versos foram escritos seguindo a ordem direta do português.
(D) o uso da ênclise, de modo geral, é a colocação mais comum entre todos os brasileiros.
(E) segundo a norma do português padrão, tanto faz utilizar a forma "Me dá..." ou a forma "Dá-me...", já que ambas estão corretas independente de contexto.

2. Os vocábulos nucleares dos Sintagmas Nominais *"...(d)o mulato sabido..."* e *"...o bom negro e o bom branco..."*, são

(A) sabido, negro, branco.
(B) mulato, bom, branco.
(C) sabido, bom, bom.
(D) mulato, negro, bom.
(E) mulato, negro, branco.

3. De acordo com a sintaxe, a alternativa onde os vocábulos apresentam a mesma função é:

(A) cigarro e camarada.
(B) do professor, do aluno, do mulato sabido.
(C) o bom negro, o bom branco e cigarro.
(D) nação brasileira e camarada.
(E) cigarro e nação brasileira.

4. A alternativa que **altera**, semanticamente, o fragmento *"...o bom negro e o bom branco/ Da nação brasileira/ Dizem todos os dias/ Deixa disso camarada..."*, é

(A) O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada.
(B) O camarada da nação brasileira diz todos os dias para que o bom negro e o bom branco deixem disso.
(C) O bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem ao camarada, todos os dias, que ele deixe disso.
(D) Deixe disso, camarada. Dizem, todos os dias, o bom negro e o bom branco da nação brasileira.
(E) Todos os dias, o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem para o camarada que deixe disso.

5. De acordo com o texto, o autor nos faz ver que:

I. Há diferença entre a gramática do professor e a gramática do aluno.
II. A gramática do professor e do aluno é a mesma que serve de base para o mulato sabido.
III. Sempre, independentemente de cor e de classe social, o povo brasileiro, ao escrever, toma por base a gramática normativa.
IV. Entre todos os brasileiros, a Língua Portuguesa não apresenta nenhuma alteração sintático-semântica.

(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
(B) Apenas a afirmativa III está correta.
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) Apenas a afirmativa IV está correta.
(E) Apenas a afirmativa II está correta.

6. Quanto à formação do texto, podemos afirmar que

(A)o articulador **Mas** divide o texto em duas partes.
(B)os três primeiros versos do texto compõem a sua primeira parte; já os outros compõem a parte final.
(C)ele se divide em três partes, cada uma composta por três versos.
(D)o articulador **Mas** introduz a terceira parte do texto.
(E)os dois primeiros versos compõem a primeira parte; o terceiro, o quarto e o quinto versos formam a segunda parte; os outros formam o final.

7. Que alternativa justifica o título do texto?

(A)O uso indiscriminado de pronomes de vários tipos.
(B) Através desse título, o autor quer mostrar que, apesar da Gramática Normativa impor um determinado tipo de colocação pronominal, a maioria dos brasileiros utiliza um outro tipo que, por pertencer à variante não-padrão, fere a norma culta da língua.
(C) No texto, a palavra *Pronominais* chama a atenção, predominantemente, para o uso da ênclise.
(D) Através do título, o autor quer mostrar, unicamente, a simples forma de utilizar os pronomes do português.
(E)A palavra *Pronominais* é utilizada para justificar que há, semanticamente, diferença entre um pronome átono utilizado após o verbo e um pronome átono utilizado antes do verbo.

Texto II



8. Sobre a parte verbal que compõe o **Texto II**, podemos afirmar que:

(A)ela foi escrita levando em consideração, predominantemente, a variante padrão da Língua Portuguesa.
(B)ela foi escrita levando em consideração, predominantemente, a variante não-padrão da Língua Portuguesa.
(C)o autor utiliza na primeira e na terceira situações a variante padrão, já na segunda e na quarta situações ele utiliza a variante não-padrão.
(D)ela foi toda escrita com base na variante padrão da Língua Portuguesa.
(E)somente na primeira situação o autor utiliza a variante padrão da língua.

9. No contexto do diálogo, qual a característica predominante encontrada nas respostas do inquirido?

(A)O uso do verbo saber.
(B)A repetição da palavra **sei**.
(C)A utilização do pronome **seu**.
(D)A expressividade lingüística advinda da insegurança do inquirido.
(E)O uso do vocativo.

10. Sobre a palavra **bifa**, que foi utilizada em "*...o depoente está a fim de tomar **uma bifa na orelha?**"*, podemos dizer que ela foi utilizada

(A)no sentido lacônico.
(B)para dar mais importância ao texto.
(C)no sentido de safanão.
(D)com o objetivo de mostrar que não é tão importante falar a verdade.
(E)com o objetivo de mostrar que o vocabulário do inquiridor é muito rico.

11. Que alternativa **não** está em conformidade com a estrutura sintático-semântica do português, com relação à posição da expressão **por acaso**, que aparece na situação 1?

(A)O depoente sabe de algum esquema no orçamento, por acaso?
(B)O depoente, por acaso, sabe de algum esquema no orçamento?
(C)O depoente sabe, por acaso, de algum esquema no orçamento?
(D)O depoente sabe de algum, por acaso esquema no orçamento?
(E)O depoente sabe de algum esquema, por acaso, no orçamento?

12. Sobre o texto, leia as seguintes assertivas:

I. A expressão "*O seu, Excelência.*" mostra que o inquirido está comprometido com a verdade.
II. A expressão "*Sim, Excelência.*" comprova a superioridade do inquiridor.
III. Há um desnivelamento claro entre as duas personagens.
IV. O objetivo do inquiridor é chegar à verdade, independente de culpados.

Estão corretas **apenas** as assertivas

(A)I e II.
(B)II e III.
(C)I, III e IV.
(D)I, II, III e IV.
(E)II, III e IV.

Texto III

Dois turistas encontram um cemitério brasileiro (argentino etc.). Vêem uma lápide onde se lê que ali jaz um político e um homem honesto. E um dos turistas comenta que é estranho. Os brasileiros (argentinos etc.) enterram duas pessoas no mesmo túmulo.

(POSSENTI, Sírio. Os humores da língua. Adaptação)

13. Sobre o texto, é **correto** afirmar que:

(A)nele predomina o período simples.
(B)ele apresenta, na sua composição, frases nominais.
(C)o verbo que compõe o seu primeiro período é de natureza intransitiva.
(D)a maioria dos períodos que o compõe são compostos.
(E)ele mescla, no seu todo, períodos simples e composto.

14. Segundo o texto, o conector **e**, utilizado em "*...que ali jaz um político e um homem honesto.*", leva um dos turistas a inferir, de forma irônica, que

(A)primeiramente se enterrou o político e, posteriormente, o homem honesto.
(B)se trata de duas pessoas diferentes.
(C)tanto faz ser político ou não, todas as pessoas são honestas, até que se prove o contrário, por isso podem ser enterradas juntas.
(D)se trata de uma mesma pessoa.
(E)todo político é um homem honesto.

15. A expressão anafórica **onde**, que aparece no texto, substitui a palavra

(A)cemitério.
(B)brasileiro.
(C)argentino.
(D)lápide.
(E)turistas.

16. De acordo com o texto, o uso dos **parênteses** e do **etc** indicam que

(A)o cemitério pode ser brasileiro, argentino ou de uma outra nacionalidade qualquer.
(B)somente nos cemitérios brasileiros e nos argentinos, duas pessoas são enterradas em um mesmo túmulo.
(C)apenas o cemitério brasileiro e o cemitério argentino apresentam normas e leis que obrigam, por economia de espaço, o enterro de mais de uma pessoa em um mesmo túmulo.
(D)os cemitérios brasileiros e argentinos apresentam valor sinonímico porque possuem as mesmas características.
(E)o enterro de duas pessoas em um mesmo túmulo só acontece nos países da América do Sul.

17. Sobre a palavra **jaz**, que aparece no texto em "*...jaz um político...*", **não** podemos afirmar que

(A)significa estar inumado.
(B)apresenta o sentido de estar imóvel.
(C)é cognata do verbo jazer.
(D)tem o mesmo sentido de lugar.
(E)significa estar sepultado.

18. Transformando para a voz passiva a oração "*Dois turistas encontram um cemitério brasileiro...*" e preservando a mesma carga semântica, a única alternativa **incorreta** é:

(A) Um cemitério brasileiro é encontrado por dois turistas.
(B) Encontra-se um cemitério brasileiro.
(C) Encontram dois turistas um cemitério brasileiro.
(D)É encontrado, por dois turistas, um cemitério brasileiro.
(E) Por dois turistas, é encontrado um cemitério brasileiro.

19. No fragmento "*E um dos turistas comenta que é estranho. Os brasileiros (argentinos etc.)...*", *o* ***ponto*** que liga os dois períodos pode ser substituído, sem que se lhe altere o sentido, pelo conector

(A)mas.
(B)todavia.
(C)pois.
(D)contudo.
(E)no entanto.

20. Qual a informação correta sobre o período "*Vêem uma lápide onde se lê que ali jaz um político e um homem honesto.*"?

(A)É um período que, sintaticamente, apresenta uma relação de equivalência entre as orações.
(B) Ele não está em conformidade com a estrutura da Língua Portuguesa.
(C) Apresenta, na sua composição, orações de natureza coordenativa.
(D)É um período formado por orações que, por apresentarem uma relação de dependência, se completam semântica e sintaticamente.
(E)É formado por orações que apresentam idéias adversas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No Brasil, a hanseníase apresenta altos índices de prevalência, apesar de ser doença de fácil tratamento. O desafio é descobrir a doença logo no seu início, pois, assim, pode-se obter sua cura sem seqüelas. Acerca dos aspectos clínicos dessa doença, assinale a alternativa correta.
(A) As manifestações neurológicas são mais vistas nas formas indeterminadas.
(B) Na forma virshoviana, afora as lesões de pele e de mucosas, podem ocorrer lesões viscerais.
(C) As formas dimorfa e virshoviana distinguem-se das demais pela presença de alteração de sensibilidade das lesões cutâneas.
(D)*Facies* leonina, tubérculo e nódulos cutâneos são características marcantes da forma tuberculóide.
(E) Casos não classificados quanto à forma clínica são considerados, para fins de tratamento, como paucibacilares.

22. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que a epidemia de tabagismo atinge hoje, no mundo, um bilhão de consumidores e que ocorrem 3,5 milhões de óbitos anuais por doenças relacionadas ao consumo do cigarro. Em geral, o início do tabagismo dá-se na adolescência e sua manutenção deve-se a uma tendência genética associada à modulação neuroquímica de um dos componentes do produto. Esse componente é o(a)

(A)acetaldeído.
(B)benzopireno.
(C)nicotina.
(D)amônia.
(E)monóxido de carbono

23. Um paciente com quarenta anos de idade, assintomático e sem comorbidades associadas, tem a medida de sua pressão arterial nos níveis de 150 × 95 mm de Hg, aferida em duas consultas realizadas com intervalo de um mês. Nessa situação, deve-se optar por um tratamento farmacológico que alie melhor eficácia e menor custo, que, no caso, situa-se no grupo dos

(A)diuréticos.
(B)beta bloqueadores.
(C)inibidores da enzima conversora da angiotensina.
(D)antagonistas do cálcio.
(E)antagonistas de receptores da angiotensina.

24. Um paciente com vinte anos de idade que procure o pronto-socorro com quadro de asma de moderada intensidade deve receber como tratamento inicial, para alívio imediato dos sintomas,

(A)oxigênio.
(B)adrenalina via sub-cutânea.
(C)brometo de ipratrópio e salbutamol via inalatória.
(D)salbutamol via inalatória.
(E)hidrocortisona via intravenosa.

25. Com relação às hepatites virais, é **incorreto** afirmar que

(A)pacientes portadores da forma crônica de hepatite B procedentes da região amazônica devem realizar a sorologia para hepatite delta.
(B)a ausência de anticorpos anti-HAV IgM torna difícil a formulação do diagnóstico de hepatite A.
(C)o diagnóstico de hepatite B ou C implica a necessidade de se pesquisar o risco de co-infecção pelo HIV.
(D)os únicos fatores de risco exclusivos da hepatite C são a transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1993 e o uso de cocaína inalada.
(E)a presença do antígeno HbsAg e ausência do anticorpo anti-HBs seis meses após o diagnóstico de hepatite B aguda é indicativa de cura.

26. É exemplo de enfermidade que pode causar proteinúria de origem renal a

I litíase renal.
II tuberculose renal.
III neoplasia benigna renal
IV trombose de veia renal.

Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas os itens II e III estão certos.
(C) Apenas os itens III e IV estão certos.
(D) Apenas os itens I, II e IV estão certos
(E) Todos os itens estão certos.

27. As drogas antidiabéticas orais representam importante recurso para o tratamento do diabetes tipo 2. Com relação ao seu principal mecanismo de ação, é correto afirmar que
(A)as biguanidas aumentam a secreção de insulina.
(B)os inibidores da alfa-glucosidae diminuem a resistência insulínica.
(C)as sulfoniluréias aumentam a secreção de insulina.
(D)as tiazolidinodionas diminuem a produção hepática de glicose.
(E)as metiglinidas tem ação semelhante às das biguanidas.

28. Portadores de artrite reumatóide apresentam mais comumente comprometimento articular da seguinte forma:

(A)acometimento simétrico de articulações, rigidez articular de longa duração e deformidade.
(B)destruição articular progressiva e presença de tofos.
(C)monoartrite dolorosa com imobilidade do membro acometido.
(D)poliartrite assimétrica com encurtamento e deformidade do membro acometido.
(E)rigidez articular de curta duração, nódulos de Heberden e Bouchard e deformidades.

29. Um paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, forma moderada, apresenta o resultado de uma gasometria arterial colhida com FiO2 de 21% com os seguintes valores: pH = 7,30; PaO2 = 55 mm de Hg; PaCO2 = 55 mm de Hg; BE = –1; bicarbonato = 20 Meq/L e Sat de O2 = 87%. Com tal resultado, é possível diagnosticar

(A)alcalose metabólica.
(B)acidose respiratória.
(C)alcalose respiratória.
(D)acidose metabólica.
(E)distúrbio misto respiratório.

30. A respeito do quadro clínico da malária no adulto, é correto afirmar que

(A)o coma da malária é mais freqüentemente causado pelo *Plasmodium vivax*.
(B)a febre, na maioria das vezes, pode ser classificada como do tipo contínua.
(C)quadros nefríticos são mais encontrados nos casos de febre quartã.
(D)os portadores da forma crônica apresentam hepatoesplenomegalia de consistência firme.
(E)sinais de hipoglicemia são mais encontrados nas infecções causadas por *Plasmodium malariae*.

31. No quinto dia pós-operatório de colecistectomia por laparotomia, um paciente apresenta bom estado geral, com 37,5 °C e sinais de infecção de ferida operatória. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada com esse paciente.

(A)antibioticoterapia até o desaparecimento da febre
(B)antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem ampla da ferida
(C)apenas drenagem ampla da ferida
(D)drenagem da ferida e cultura e antibiograma da secreção
(E)exame ultra-sonográfico da parede abdominal para definir a conduta

32. No paciente com traumatismo de crânio e face, a conduta inicial mais importante é

(A)manter a circulação.
(B)proteger a coluna cervical.
(C)assegurar a permeabilidade das vias aéreas.
(D)realizar tomografia computadorizada de crânio.
(E)determinar o escore da Escala de Coma de Glasgow.

33. Assinale a alternativa que apresenta o fator mais comumente associado ao aparecimento de hérnia incisional.

(A)complicações pulmonares pós-operatórias
(B)infecção da ferida operatória
(C)obesidade
(D)idade avançada do paciente
(E)sexo feminino do paciente

34. Na operação para apendicite aguda, deve-se indicar a colocação de um dreno

I. em vigência de peritonite generalizada.
II. na presença de abscesso na fossa ilíaca direita.
III. sempre que houver necrose e perfuração do apêndice.

Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas os itens I e III estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

35. A dosagem sérica do antígeno carcinoembrionário (CEA) é indicada para o(a)

(A) diagnóstico de adenocarcinoma colorretal inicial.
(B) vigilância de pessoas com história familiar de câncer colorretal.
(C) diagnóstico de metástase do câncer colorretal.
(D) vigilância de pessoas com baixo risco para adenocarcinoma colorretal.
(E) acompanhamento de pacientes operados de adenocarcinoma colorretal.

36. Uma paciente é admitida com quadro clínico compatível com pancreatite aguda leve. A ecografia do abdome revela colelitíase. Nessa situação, o melhor momento para a realização da colecistectomia será

(A) nas primeiras 24 h após a internação, visando à desobstrução do colédoco.
(B) nas primeiras 48 h, pelo risco de novo episódio de pancreatite.
(C) após a remissão clínica e laboratorial do quadro, porém na mesma internação hospitalar.
(D) após quatro semanas de estabilização do quadro clínico.
(E) após oito semanas de estabilização clínica.

37. Uma paciente do sexo feminino, quarenta anos de idade, apresenta nódulo único na tireóide com 4 cm de diâmetro. A punção-biópsia com agulha fina revelou presença de células foliculares. Nessa situação, a melhor conduta a ser adotada será

(A) o acompanhamento clínico, com avaliações ecográficas semestrais.
(B) repetir a biópsia com agulha fina, na expectativa de identificar sinais de malignidade.
(C) repetir a biópsia com agulha de grosso calibre.
(D) indicar a lobectomia tiroidiana com istmectomia.
(E) solicitar cintilografia da tireóide para avaliar a captação do nódulo.

38. Assinale o melhor tratamento para uma paciente que se apresenta com colecistite aguda.

(A) colecistectomia em caráter de urgência relativa
(B) antibioticoterapia e colecistectomia após período de sete a dez dias de tratamento conservador
(C) antibioticoterapia, remissão do processo inflamatório e colecistectomia eletiva
(D) antibioticoterapia e esfincterotomia endoscópica
(E) colecistostomia após dez dias de tratamento conservador

39. Um homem de vinte anos de idade queixa-se de incômodo na região inguinal direita, que se acentua durante esforços físicos. No exame, foi detectada a presença de abaulamento em região inguinal direita, que se acentua à manobra de Valsalva. O diagnóstico é de uma pequena hérnia inguinal. A partir desse momento, deve-se

(A) encaminhar o doente para o cirurgião, pois é bom que ele seja operado logo.
(B) solicitar que o doente não faça esforços físicos e volte em seis meses para ser reavaliado.
(C) solicitar estudo ultra-sonográfico da região inguinal para confirmar o diagnóstico, antes de se decidir por uma conduta definitiva.
(D) solicitar radiografia de tórax, eletrocardiograma e estudo da coagulação sangüínea, para, então, estabelecer-se a indicação cirúrgica.
(E) aconselhar o doente a aguardar a evolução, tendo em vista o pequeno tamanho da hérnia.

40. Um paciente ictérico, submetido a uma colangiopancreatografia endoscópica retrógrada desenvolve, 24 horas após, dor em hipocôndrio direito, febre, confusão mental e hipotensão. Nessa situação, o diagnóstico provável é de

(A) pancreatite aguda.
(B) colecistite aguda.
(C) fístula duodenal.
(D) lesão de colédoco.
(E) colangite aguda supurativa.

41. Com relação aos dois primeiros anos de vida de uma criança com desenvolvimento normal, assinale a alternativa **incorreta**.

(A) Aos doze meses, a criança apresenta capacidade de pinça com o dedo indicador e o polegar.
(B) Aos dois anos, a criança está na fase das birras.
(C) A partir de um ano e meio, a criança começa a usar a colher para comer.
(D) É uma fase de manipulação dos genitais e masturbação.
(E) Aos dezoito meses, inicia-se o controle dos esfíncteres.

42. A desnutrição energético-proteica (DEP), provocada pela fome crônica, é a principal doença nutricional do ser humano, revestindo-se, na criança, de uma grande morbimortalidade, com graves prejuízos para o seu completo desenvolvimento físico e mental. As alterações metabólicas do desnutrido **não** incluem a

(A) hipernatremia.
(B) diminuição dos lipídeos totais.
(C) hipoglicemia.
(D) diluição dos espaços IC e EC.
(E) hipopotassemia.

43. O início da puberdade na adolescência é definido pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários e classificado pelos Critérios de Tanner. Assinale a alternativa que apresenta o primeiro caracter sexual secundário que aparece, respectivamente, em meninas e em meninos.

(A) aumento da auréola – crescimento do pênis em comprimento
(B) aparecimento dos pêlos axilares – crescimento dos testículos
(C) elevação do mamilo – mudança na voz
(D) aparecimento de pêlos pubianos – crescimento do pênis em diâmetro
(E) aparecimento do broto mamário – crescimento dos testículos

44. Considera-se retardo puberal a ausência de qualquer caracter sexual secundário em meninas e em meninos, respectivamente, a partir das seguintes idades:

(A) 12 e 13 anos
(B) 13 e 14 anos
(C) 14 e 15 anos
(D) 15 e 15 anos
(E) 15 e 16 anos.

45. Uma criança normal a termo

(A) dobra de peso ao redor dos três meses de vida.
(B) cresce, em geral, 15 cm nos primeiros seis meses de vida.
(C) dobra sua altura ao final do primeiro ano de vida.
(D) triplica seu peso ao redor dos seis meses de vida.
(E) cresce cerca de 10 cm ao ano na idade pré-escolar.

46. Um paciente de nove anos de idade é levado por sua mãe para uma consulta de rotina em um ambulatório de pediatria. Ela informa que a criança apresenta, diariamente, quadro de dispnéia, tosse e chiado no peito, e que, no último mês, apresentou sintomas noturnos por três vezes, além de duas internações no pronto-socorro do hospital. Disse também que há história de asma na família. De acordo com o Consenso Brasileiro de Asma de 2002, julgue os itens que se seguem, relativos à situação descrita acima.

I. O antileucotrieno poderá ser associado como medicação alternativa ao corticóide inalatório e Beta 2 agonista de longa duração no tratamento de manutenção desse paciente.
II. O paciente deverá receber Beta 2 agonista de longa duração para o alívio das crises associado a corticóide oral em dias alternados.
III. Não há indicação para o tratamento de manutenção desse paciente com corticóide inalatório por se tratar de quadro de asma intermitente, segundo classificação do Consenso.
IV. Deverá ser iniciado esquema de manutenção desse paciente com corticóide inalatório e Beta 2 agonista de longa duração, com prescrição de Beta 2 agonista de curta duração para o alívio das crises.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

47. Um estudante com sete anos de idade é levado ao serviço médico por apresentar tosse seca persistente, sem horário preferencial, há aproximadamente quinze dias. A mãe afirma que, nos primeiros cinco dias da doença, havia também febre baixa, cefaléia, rouquidão e mialgia. Afirma também que um outro filho, com treze anos, apresentou quadro semelhante no mês anterior, mas que se curou espontaneamente. No caso atual, foi solicitado raio-X de tórax, que evidenciou infiltrado intersticial bilateral difuso, apesar de um quadro clínico pouco expressivo. Assinale a alternativa que apresenta, para a situação descrita, um diagnóstico provável e o tratamento adequado.

(A) tuberculose – esquema tríplice
(B) pneumonia por micoplasma – claritromicina
(C) coqueluche – sulfametoxazol e trimetropin
(D) bronquiolite – penicilina benzatina
(E) asma – salbutamol

48. A cetoacidose diabética é a urgência endocrinometabólica mais comum na infância, ocorrendo como primeira manifestação do diabetes insulinodependente em cerca de 30% a 40% das crianças e dos adolescentes. O diagnóstico dessa condição baseia-se em critérios clínicos e laboratoriais, que **não** incluem

(A) respiração acidótica.
(B) alteração do sensório.
(C) desidratação.
(D) $7{,}4 < pH < 7{,}5$.
(E) glicemia ≥ 300 mg/dL

49. As parasitoses intestinais constituem uma das enfermidades mais comuns da humanidade, apresentando ampla distribuição geográfica, representando graves problemas de ordem sanitária e social nos países subdesenvolvidos e causando infecção grave quando atingem crianças menores. Assinale a alternativa que apresenta apenas parasitas que fazem ciclo pulmonar.

(A) enterobius vermiculares – ascaris lumbricóides – giárdia lamblia
(B) áscaris lumbricóides – trichuris trichiura – entamoeba histolítica
(C) hymenolepis nana – estrongilóides estercoralis – enterobius vermiculares
(D) hymenolepis nana – giárdia lamblia – trichuris trichiura
(E) ancilostoma duodenale – áscaris lumbricóides – estrongilóides estercoralis

50. As anemias carenciais constituem um dos mais importantes problemas de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, afetando especialmente crianças entre seis meses e três anos de idade, assim como gestantes e mulheres em idade fértil. Assinale a alternativa que apresenta um exame que se altera precocemente na anemia ferropriva.

(A)ferro sérico
(B)capacidade de ligação de ferro
(C)ferritina sérica
(D)saturação de transferrina
(E)contagem de reticulócitos

51. Sabe-se que houve um aumento mundial das taxas de cesariana. Múltiplos fatores, tais como aspectos legais, psicológicos, sociais e econômicos, têm contribuído para esse aumento. Esforços para se reduzirem essas altas taxas muitas vezes são desapontadores. Quanto às indicações de cesariana, é correto afirmar que

(A)a cesariana exige os mesmos cuidados médicos e técnicos que um parto normal.
(B)a morbidade entre a cesariana eletiva e o parto vaginal é a mesma.
(C)o médico assistente não está obrigado a realizar um procedimento para o qual não há indicação médica que o justifique.
(D)há forte evidência, até o momento, de que uma cesariana eletiva seja mais segura que o parto normal.
(E)não há, nos dias atuais, risco para a mãe e para o feto durante uma cesariana.

52. Nos países desenvolvidos, as amplas implementações de intervenções para a redução da transmissão vertical do HIV resultaram na redução significativa da incidência de casos de crianças com AIDS. Com relação a esse assunto, é **incorreto** afirmar que

(A)o diagnóstico precoce das pacientes soropositivas, possibilitando intervenção com anti-retrovirais, ainda não alcançou a cobertura ideal no Brasil.
(B)o aleitamento materno para gestantes soropositivas é importante, não aumentando o risco de transmissão.
(C)a transmissão vertical do HIV, sem nenhuma intervenção, situa-se em torno de 20% e, com o uso combinado de determinadas intervenções, pode ser reduzida para menos de 1%.
(D)a carga viral elevada e a ruptura prolongada das membranas amnióticas são reconhecidas como os principais fatores associados à transmissão vertical do HIV.
(E)a maior parte dos casos de transmissão vertical ocorre durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito.

53. Diabetes gestacional é uma das mais freqüentes intercorrências clínicas da gestação, acometendo cerca de 1% das gestantes. Nessa situação, é **incorreto** afirmar que

(A)a gestante obesa sem história familiar de diabetes e antecedentes obstétricos de macrossomia tem risco aumentado para exibir a doença.
(B)o rastreamento deve ser realizado entre 24 e 28 semanas de idade gestacional.
(C)há um aumento no risco de doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG), polidramnia e infecção urinária nessas gestantes.
(D)o corticóide está contra-indicado para essas gestantes, devido ao seu efeito hiperglicemiante, mesmo em casos de parto prematuro.
(E)há incidência aumentada de síndrome da angústia respiratória e hipoglicemia nesses recém-nascidos.

54. A doença hipertensiva da gravidez é uma das grandes causas de mortalidade materna em todo o mundo. Assinale a alternativa que apresenta apenas fatores que levam ao diagnóstico de gravidade da mesma.

(A)pressão arterial maior ou igual a 140/90 mmHg ou aumento de 30 mmHg na pressão sistólica ou de 15 mmHg na diastólica
(B)ácido úrico acima de 6 mg/dL
(C)proteinúria acima de 300 g/L medida em urina de 24 horas
(D)incisura bilateral das artérias uterinas ao Doppler
(E)cefaléia, turvação visual e epigastralgia

55. A atenção básica na gravidez inclui a prevenção, a promoção da saúde e o tratamento dos problemas que ocorrem durante o período gestacional e após o parto. Quanto à assistência pré-natal, é correto afirmar que

(A)a adesão das mulheres ao pré-natal está relacionada à qualidade da assistência prestada pelo serviço e pelos profissionais de saúde e à qualidade da interação da gestante e da sua família com os profissionais de saúde visando à maior humanização do atendimento do parto.
(B)a realização de uma única ultra-sonografia deverá ocorrer após a vigésima semana de gestação.
(C)está indicada a administração de rotina de imunoglobulina anti-Rh para todas as gestantes Rh negativo, coombs indireto positivo e parceiro Rh negativo, durante a vigésima oitava semana de gestação e, logo após o parto, para a prevenção da doença hemolítica perinatal.
(D)a administração do ácido fólico para a proteção de defeitos do tubo neural deve iniciar após o primeiro trimestre de gestação.
(E)vacinas para tétano, hepatite B e sarampo podem ser aplicadas na gestação, se necessário.

56. Quanto à anatomia da pelve feminina, assinale a alternativa **incorreta**.

(A)O diafragma pélvico é a denominação do conjunto anatômico formado pelos músculos levantador do ânus e coccígeo.
(B)O músculo pubococcígeo é a porção mais medial e cefálica do músculo levantador do ânus.
(C)O principal componente do diafragma urogenital é o músculo transverso superficial do períneo.
(D)A vascularização venosa ovariana faz-se por meio de um bem desenvolvido plexo, drenando, através das veias ovarianas, para a veia cava inferior à direita e para a veia renal à esquerda.
(E)A artéria uterina é ramo médio da artéria ilíaca interna.

57. Com relação ao ciclo menstrual normal, é correto afirmar que

(A)os estrogênios estimulam a secreção de FSH e inibem a de LH.
(B)o hipotálamo, mediante a secreção dos GnRH, modula a secreção hipofisária de FSH e de LH.
(C)se formam, nos ovários, sob a influência do LH, androgênios que serão convertidos em estrogênios nas células da teca.
(D)o nível adequado de estrogênios e o pico do FSH são episódios obrigatórios para a ovulação.
(E)o estradiol, no período pós-ovulatório, alcança níveis iguais ou superiores a 200 pg/mL.

58. Assinale a alternativa que associa corretamente o tipo de câncer a fatores de risco correspondentes.

(A)colo uterino – infecção pelo HPV, multiplicidade de parceiros, início precoce da atividade sexual e tabagismo
(B)mama – história familiar, hiperplasia ductal atípica, dieta hipocalórica e pobreza em selênio
(C)endométrio – hiperplasia complexa com atipia, tabagismo e terapia de reposição hormonal
(D)ovário – história familiar, anticoncepcionais hormonais orais e laqueadura tubária
(E)vulva – NIV III, imunossupressão e diabetes

59. Quanto à endometriose, doença responsável por cerca de 20% das causas de infertilidade feminina, é correto afirmar que

I. os principais sintomas são: dismenorréia progressiva que inicia no período pré-menstrual e dispareunia profunda.
II. a intensidade dos sintomas não se correlaciona com a gravidade da doença.
III. o diagnóstico é cirúrgico, sendo realizado preferencialmente por videolaparoscopia.

Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas o item I está certo.
(B) Apenas o item II está certo.
(C) Apenas os itens I e III estão certos.
(D) Apenas os itens II e III estão certos.
(E) Todos os itens estão certos.

60. Assinale a alternativa que associa corretamente método contraceptivo e paciente.

(A) DIU T Cu 380A – paciente adolescente nuligesta
(B) anticoncepcional hormonal injetável mensal – paciente com câncer de mama tratado, sem evidência de doença ativa nos últimos cinco anos
(C) anticoncepcional hormonal oral – paciente com hipertensão arterial controlada
(D) acetato de medroxiprogesterona 150 mg trimestral – paciente com anemia falciforme
(E) laqueadura tubária – paciente com sangramento vaginal anormal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS

GABARITO NÍVEL SUPERIOR – OFICIAL MÉDICO

LÍNGUA PORTUGUESA	
QUESTÃO	RESPOSTA
1	A
2	E
3	B
4	B
5	E
6	A
7	B
8	A
9	E
10	C
11	D
12	NULA
13	E
14	B
15	D
16	A
17	D
18	C
19	C
20	D

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS				
QUESTÃO	RESPOSTA		QUESTÃO	RESPOSTA
21	B		41	D
22	C		42	A
23	A		43	E
24	D		44	B
25	E		45	B
26	E		46	C
27	C		47	B
28	A		48	D
29	B		49	E
30	D		50	C
31	D		51	C
32	C		52	B
33	B		53	D
34	B		54	E
35	E		55	A
36	C		56	C
37	D		57	B
38	A		58	A
39	A		59	E
40	E		60	D