

LÍNGUA PORTUGUESA

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

UTILIZE O TEXTO I PARA RESPONDER AS
QUESTÕES DE 1 A 6.

Texto I

A ESTAÇÃO DO PANTANAL

Começa neste mês a época ideal para viajar ao Pantanal, sem as chuvas que atrapalham a vida dos turistas entre novembro e abril.

Avistar animais fica fácil, pois eles se reúnem em torno das lagoas. A pesca esportiva é permitida, dentro de certos limites. O período de seca também é bom para mergulho. Maio e junho ainda são considerados meses de baixa temporada. É possível encontrar pacotes entre 1400 e 2600 reais, por pessoa, para três noites, com transporte aéreo incluído. Na alta temporada, os pacotes podem custar o dobro. Além de caminhadas e cavalgadas, é possível passear de lancha, fazer a focagem noturna de animais e conhecer a rotina das fazendas locais. Diferentes regiões do Pantanal resultam em viagens diferentes. O Pantanal Norte, aonde se chega via Cuiabá, é o melhor acesso para conhecer o parque nacional e atravessar a rodovia Transpantaneira, rica em animais silvestres. No Pantanal Sul, com acesso via Campo Grande, ficam fazendas que têm boa estrutura de passeios e hospedagem.

(Veja, 12/05/04)

1. De acordo com o tipo de composição, o texto é, predominantemente,

- (A) narrativo-informativo.
- (B) descritivo-narrativo.
- (C) descritivo-informativo.
- (D) narrativo-argumentativo.
- (E) expositivo-argumentativo.

2. Ao deslocarmos a expressão **Na alta temporada**, usada em “Na alta temporada, os pacotes podem custar o dobro.” (linhas 11/12), a frase que apresenta desvio sintático-semântico é:

- (A) Os pacotes, na alta temporada, podem custar o dobro.
- (B) Os pacotes podem, na alta temporada, custar o dobro.

(C) Os pacotes podem custar o dobro na alta temporada.

(D) Os pacotes podem custar o, na alta temporada dobro.

(E) Os pacotes podem custar, na alta temporada, o dobro.

3. O **que**, utilizado em “...sem as chuvas **que** atrapalham a vida dos turistas entre novembro e abril.”(linhas 2/3), apresenta valor sintático de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) agente da passiva.
- (E) aposto.

4. O único vocábulo que, sem alterar o sentido da frase, **não** substitui o conector **pois**, que aparece em “...pois eles se reúnem em torno das lagoas.”(linhas 4/5), é

- (A) posto que.
- (B) porque.
- (C) já que.
- (D) visto que.
- (E) desde que.

5. De acordo com o texto, podemos afirmar que:

I. O autor aponta várias opções de diversão ao turista que visita o Pantanal.

II. O núcleo do SN “Diferentes regiões do Pantanal...” é o vocábulo **Pantanal**.

III. A oração “Maio e junho ainda são considerados meses de baixa temporada.”, foi escrita na voz passiva.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e III estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I está correta.
- (E) I, II e III estão corretas.

6. A expressão que possui o mesmo valor sintático de “...a vida dos turistas...”, que foi usada no primeiro parágrafo, é:

- (A) “O período de seca...” (linhas 6/7)
- (B) “Na alta temporada...” (linha 11)
- (C) “Além de caminhadas...” (linha 12)
- (D) “O Pantanal Norte...” (linha 16)
- (E) “...boa estrutura de passeios e hospedagem.” (linhas 21/22)

UTILIZE O TEXTO II PARA RESPONDER AS
QUESTÕES DE 7 A 10.

Texto II

MÃOS DADAS

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista
da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por
serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os
homens presentes,
a vida presente.

Carlos Drummond de Andrade

7. De acordo com o texto, o autor sente-se:

- (A) importante por ser poeta.
- (B) diferente dos outros homens porque sabe fazer poesia.
- (C) um homem normal no meio de outros homens.
- (D) um ser superior em consequência da sua poesia.
- (E) um homem que, por ser poeta, não se preocupa com o seu semelhante.

8. Na primeira estrofe, os versos que melhor comprovam a preocupação do autor com o hoje é:

- (A) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Também não cantarei o mundo futuro.
- (B) Também não cantarei o mundo futuro./ Estou preso à vida e olho meus companheiros.
- (C) Também não cantarei o mundo futuro./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
- (D) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
- (E) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

9. De acordo com o texto, quais os versos que comprovam que o mundo atual é muito grande e cheio de obstáculos e, em consequência disto, as pessoas devem se unir para vencer esses obstáculos?

- (A) Também não cantarei o mundo futuro./Estou preso à vida e olho meus companheiros.
- (B) O presente é tão grande, não nos afastemos./Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
- (C) O presente é tão grande, não nos afastemos./ Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
- (D) Estou preso à vida e olho meus companheiros./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
- (E) O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,/ a vida presente.

10. Além da função poética que permeia todo o texto, que outra função da linguagem nele predomina?

- (A) Metalingüística.
- (B) Referencial ou Informativa.
- (C) Emotiva ou Expressiva.
- (D) Conativa ou Apelativa.
- (E) Fática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Quais os órgãos mais afetados pela sarcoidose?
- (A) Gânglios (85%), pulmões (90%), olhos (35%) e pele.
 - (B) Pulmões (90%), gânglios (33%) e pele (25%).
 - (C) Pulmões (70%), gânglios (33%) e sistema nervoso (45%).
 - (D) Músculos esqueléticos (45%), pele (25%) e pulmões (60%).
 - (E) Pele (50%), gânglios (50%), pulmões (60%) e articulações (40%).

12. Paciente de 30 anos tem procurado atendimento médico semanal desde que se mudou para Macapá há 4 meses, queixando-se de dispnéia intensa e chiado que melhoram parcialmente com medicamentos que usa no Pronto Socorro, persistindo com sintomas inclusive à noite. Refere que desde a infância tem essas queixas, mas eram esporádicas. Qual a proposta medicamentosa para este paciente?

- (A) Glicocorticóide inalatório e teofilina.
- (B) β_2 - agonista inalatório de longa duração e glicocorticóide inalatório.
- (C) Glicocorticóide oral e β_2 - agonista inalatório de longa e curta duração.
- (D) β_2 -agonista de longa duração e teofilina.
- (E) Brometo de ipratrópio e β_2 -agonista de curta duração.

13. Paciente de 83 anos, sem queixas cardíacas ou pulmonares prévias, refere falta de ar de início súbito no pós-operatório de uma hernioplastia inguinal direita, por hérnia inguinal estrangulada. O diagnóstico mais provável e o procedimento mais adequado são, respectivamente,

- (A) choque séptico - terapêutica com drogas vasoativas.
- (B) infarto agudo do miocárdio - dosagem sérica de CKMB.
- (C) ICC - administração de digital e diurético.
- (D) embolia pulmonar - cintilografia pulmonar ventilação/perfusão.
- (E) broncoespasmo - administração de broncodilatadores.

14. Um jovem com 30 anos de idade, com pneumonia e discreta alteração da consciência, temperatura axilar: 37,8°C, frequência respiratória: 32ipm, frequência respiratória: 100bpm, PA: 70 x 40mmHg, discretas crepitações em base direita, com radiografia do tórax, mostrando discreto infiltrado alveolar em base D. Qual a conduta ?

- (A) Tratamento ambulatorial com antibiótico de amplo espectro via oral.
- (B) Tratamento hospitalar em enfermaria.
- (C) Tratamento ambulatorial com antibiótico de amplo espectro via intramuscular.
- (D) Tratamento ambulatorial com antibiótico macrolídeo.
- (E) Tratamento hospitalar em ambiente de terapia intensiva.

15. Quanto ao tratamento da insuficiência cardíaca congestiva é correto afirmar que

- (A) o uso de digital deve ser evitado nos pacientes com fibrilação atrial.
- (B) os tiazídicos não devem ser usados nos pacientes normotensos.
- (C) o uso de inibidores da ECA parece prolongar a expectativa de vida dos pacientes.
- (D) os nitratos não devem ser usados devido à grande taquicardia reflexa que pode ocorrer.
- (E) a quinidina é a droga de escolha na arritmia induzida por digitálicos.

16. Na insuficiência renal crônica encontramos:

- (A) hipofosfatemia, hipercalcemia, hiponatremia.
- (B) hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipertrigliceridemia.
- (C) hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipoinsulinemia.
- (D) hipocalcemia, hipofosfatemia, hipertrigliceridemia.
- (E) hipocloremia, hipercalcemia, hipercalemia.

17. Um paciente de 54 anos, tabagista, trabalhador braçal, refere que há 2 dias vem apresentando episódios de dor nas regiões retroesternal e dorsal, com irradiação para os ombros e braços, relacionados com esforço e que cessam após 5 a 10 minutos de repouso. O último episódio ocorreu há cerca de 1 hora, depois de subir 2 lances de escada, e ainda persiste. Nega outros antecedentes mórbidos. O exame físico mostra um paciente ansioso, com pulso de 90 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 x 90 mmHg, com ausculta cardíaca e pulmonar normais e aumento da sensibilidade à palpação do esterno e das articulações costo-esternais esquerdas, sem outras alterações. O eletrocardiograma é normal. A conduta correta é

(A) administrar antiinflamatório não-hormonal e solicitar uma radiografia de tórax e de coluna vertebral.

(B) administrar ácido acetilsalicílico e heparina e internar o paciente para cuidados especializados.

(C) internar imediatamente o paciente e prescrever fibrinolítico intravenoso.

(D) prescrever ácido acetilsalicílico, nitrato sublingual, se necessário, repouso em casa e encaminhar o paciente para um ambulatório de cardiologia.

(E) prescrever um antiinflamatório não-hormonal e um ansiolítico e observar a evolução clínica por algumas horas.

18. Uma adolescente com 15 anos de idade foi internada na emergência com quadro de abdome agudo devido a cisto de ovário torcido. No exame de acompanhamento pós-operatório, observou-se sopro sistólico em foco pulmonar mais desdobramento fixo de 2ª bulha. A suspeita clínica é de:

(A) anemia.

(B) estenose pulmonar.

(C) endocardite bacteriana.

(D) comunicação interatrial.

(E) prolapso de válvula mitral.

19. Associe as doenças relativas à hipertensão arterial relacionadas com seus respectivos sinais abaixo.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Coarctação da aorta | () Sopro abdominal |
| 2. Tireotoxicose | () Edema de papila |
| 3. Hipertensão arterial renovascular | () Hipertensão arterial sistólica |
| 4. Hipertensão arterial maligna | () Diferença de amplitude de pulsos em membros superiores e inferiores. |
| 5. Poliarterite nodosa | () Positividade para o HbsAg |

Qual a seqüência correta?

(A) 3,4,2,1,5

(B) 1,2,3,4,5

(C) 2,3,1,5,4

(D) 5,4,3,1,2

(E) 3,2,4,1,5

20. Com relação ao ataque agudo de gota, podemos afirmar que

(A) é mais comum em mulheres em pré-menopausa.

(B) ocorre mais freqüentemente no período vespertino.

(C) em 85% das vezes é uma monoartrite.

(D) a articulação mais comumente comprometida é a do cotovelo.

(E) cursa com febre e leucocitose na maioria dos casos.

21. Homem de 20 anos sofre trauma abdominal com ruptura esplênica e choque hipovolêmico. No quinto dia de pós-esplenectomia, evoluiu com aumento de escórias nitrogenadas (uréia: 80mg%, creatinina 2,5mg%), sódio urinário: 10 mEq/l e índice de insuficiência renal de 0,8. A principal hipótese diagnóstica é:

(A) necrose cortical bilateral.

(B) glomerulonefrite da reperfusão.

(C) necrose tubular aguda.

(D) azotemia pré-renal.

(E) ligadura acidental da artéria renal esquerda.

22. Considere as afirmativas a seguir, relacionadas às doenças da tireóide:

I. As manifestações típicas da doença de Graves incluem bócio tóxico difuso, oftalmopatia e dermatopatia.

II. O hipotireoidismo primário deve sempre apresentar níveis de TSH sérico aumentado.

III. A dosagem de tireoglobulina está indicada para o acompanhamento pós-operatório do carcinoma medular da tireóide.

IV. No hipotireoidismo secundário a doença hipotalâmica os níveis de TSH são elevados.

As afirmativas que estão **incorretas** são:

(A) somente IV.

(B) somente I e III.

(C) somente III e IV.

(D) somente I, II e IV.

(E) somente I, III e IV.

23. A reposição hormonal de um homem de 34 anos de idade que foi submetido à supra-renalectomia para feocromocitoma bilateral deve incluir?

(A) Glicocorticóides – Mineralocorticóides.

(B) Mineralocorticóides – Esteróides sexuais.

(C) Esteróides sexuais – Glicocorticóides.

(D) Catecolaminas – Esteróides sexuais.

(E) Glicocorticóides – Catecolaminas.

24. Acerca da associação entre a *Helicobacter pylori* e a gastrite, a afirmativa **incorreta** é:

(A) Acredita-se que o crescimento da *H. pylori* no estômago seja a causa da gastrite crônica, enquanto que o crescimento no duodeno não está claramente implicado na patologia da úlcera duodenal.

(B) O *H. pylori* é um bacilo gram negativo que produz uma inflamação da mucosa gástrica.

(C) O *H. pylori* pode ser identificada pela sua capacidade de clivar a uréia.

(D) A erradicação da bactéria resulta na melhora histológica da mucosa gástrica.

(E) A ampicilina, metronidazol associados a omeprazol podem erradicar a *H. pylori*.

25. Um homem de 50anos de idade durante triagem para doação de sangue apresenta anti-HBsAg positivo. Conclui-se, então, que

(A) deve ser portador de hepatite aguda por vírus B.

(B) é um provável portador de hepatite crônica ativa.

(C) encontra-se imune para hepatite por vírus B.

(D) apenas a biópsia hepática nos orientará quanto a gravidade da lesão hepática.

(E) é um provável portador de hepatite crônica lobular.

26. Paciente submetido à colecistectomia há 3 meses apresenta icterícia flutuante, associada a episódios de febre, dor em hipocôndrio direito e calafrios. A hipótese diagnóstica provável é:

(A) Hepatite.

(B) Cálculo residual do colédoco.

(C) Estenose cicatricial das vias biliares extra-hepáticas.

(D) Síndrome de Mirrizzi.

(E) Tumor da confluência dos hepáticos.

27. Doente portadora de úlcera justa-pilórica é admitida com quadro de vômitos repetidos nos últimos dias. Ao exame físico encontra-se apática, estável hemodinamicamente, com respiração lenta. Os exames laboratoriais solicitados provavelmente mostrarão: sódio, potássio, cloro, uréia, pH, pCO₂ e bicarbonato.

(A) 130mEq/l, 5,2mE/l, 70mEq/l, 80mg/dl, 7,0, 50mmHg e 20mE/l

(B) 130mEq/l, 4,0mEq/l, 100mEq/l, 100mg/dl, 7,30, 30mmHg e 20mE/l

(C) 130mE/l, 2,5mEq/l, 70mEq/l, 60mg/dl, 7,60, 48mmHg e 40mE/l.

(D) 140mEq/l, 5,0mEq/l, 110mEq/l, 120mg/dl, 7,20, 28mmHg e 28mE/l.

(E) 130mE/l, 2,0mE/l, 110mEq/l, 60mg/dl, 7,10, 12mmHg e 12mEq/l

28. Um paciente de 40 anos evoluiu com quadro clínico compatível com colecistite aguda e choque séptico; foi tratado clinicamente durante 10 dias, sem melhora clínica. Realizado CT, mostrou volumoso do abscesso hepático em segmento 7. O paciente foi operado, realizada colecistectomia à Torek e drenagem do abscesso. Evoluiu no pós-operatório com pneumonia e derrame pleural bilateral, não respondendo ao esquema de antibiótico amicacina + metronidazol e ampicilina. Procedeu-se a uma toracocentese para a coleta de material, que foi enviado para a cultura. Neste caso, o melhor esquema terapêutico empírico de antibióticos, dentre os abaixo, até o resultado da hemocultura, é:

- (A) oxalina e clindamicina.
- (B) ceftriaxona e azitromicina.
- (C) aztreonam e vancomicina.
- (D) piperacilina + tazobactam e ciprofloxacina.
- (E) metronidazol + tobramicina + cefamandol.

29. Os cálculos renais se encontram entre um dos problemas médicos mais comuns nos países ocidentais. A cólica nefrética é causa freqüente de hospitalização. Em relação à litíase renal, qual a alternativa **incorreta**?

- (A) Aproximadamente 80 a 90% dos cálculos são compostos de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio ou mistura dessas substâncias.
- (B) A hipercalciúria idiopática é um distúrbio metabólico freqüentemente encontrado, acometendo 50% dos portadores de cálculo renal.
- (C) O cálculo de estruvita ou fosfato triplo amoníaco magnésiano tem uma prevalência em torno de 5 a 10%. Sua precipitação ocorre em consequência da ação de bactérias produtoras de urease reduzindo o pH urinário.
- (D) São fatores de risco para nefrolitíase: dieta rica em sódio e oxalato, pouca ingestão de líquido, uso de drogas como corticóide, vitamina C e D.
- (E) A eliminação espontânea de cálculos renais ocorre em até 80% dos cálculos < 5mm.

30. Qual das combinações de parasitas e respectivos sintomas não está indicada corretamente?

- (A) Ancilostoma duodenale - Anemia.
- (B) Ascaris lumbricoides - Diarréia intensa.
- (C) Giardia lamblia - Síndrome disarbsortiva.
- (D) Strongyloides stercoralis - Infestação grave em desnutridos.
- (E) Tricocephalus trichurus - Prolapso retal.

REDAÇÃO

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. A sua redação deverá ser escrita, rigorosamente, dentro do limite de 10 a 25 linhas. O candidato que não cumprir com esta determinação será penalizado com a perda de 6,0 pontos.
2. **Não** serão avaliadas as redações que tenham qualquer assinatura ou marca identificadora.
3. As redações feitas de lápis serão **desconsideradas**.
4. Se as instruções relativas ao tema não forem seguidas, a redação será **anulada**.
5. Utilize este boletim como rascunho e passe a sua redação definitiva para o Formulário de Redação.

PROPOSTA DA REDAÇÃO

Em consequência do **ALTO ÍNDICE DE DESEMPREGO**, o Brasil atravessa uma grande crise no setor social.

Com base na afirmativa acima, elabore um texto predominantemente dissertativo indicando, pelo menos, **TRÊS SOLUÇÕES** para este grave problema.

