

LÍNGUA PORTUGUESA

MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

UTILIZE O TEXTO I PARA RESPONDER AS
QUESTÕES DE 1 A 6.

Texto I

A ESTAÇÃO DO PANTANAL

Começa neste mês a época ideal para viajar ao Pantanal, sem as chuvas que atrapalham a vida dos turistas entre novembro e abril.

Avistar animais fica fácil, pois eles se reúnem em torno das lagoas. A pesca esportiva é permitida, dentro de certos limites. O período de seca também é bom para mergulho. Maio e junho ainda são considerados meses de baixa temporada. É possível encontrar pacotes entre 1400 e 2600 reais, por pessoa, para três noites, com transporte aéreo incluído. Na alta temporada, os pacotes podem custar o dobro. Além de caminhadas e cavalgadas, é possível passear de lancha, fazer a focagem noturna de animais e conhecer a rotina das fazendas locais. Diferentes regiões do Pantanal resultam em viagens diferentes. O Pantanal Norte, aonde se chega via Cuiabá, é o melhor acesso para conhecer o parque nacional e atravessar a rodovia Transpantaneira, rica em animais silvestres. No Pantanal Sul, com acesso via Campo Grande, ficam fazendas que têm boa estrutura de passeios e hospedagem.

(Veja, 12/05/04)

1. De acordo com o tipo de composição, o texto é, predominantemente,

- (A) narrativo-informativo.
- (B) descritivo-narrativo.
- (C) descritivo-informativo.
- (D) narrativo-argumentativo.
- (E) expositivo-argumentativo.

2. Ao deslocarmos a expressão **Na alta temporada**, usada em “Na alta temporada, os pacotes podem custar o dobro.” (linhas 11/12), a frase que apresenta desvio sintático-semântico é:

- (A) Os pacotes, na alta temporada, podem custar o dobro.
- (B) Os pacotes podem, na alta temporada, custar o dobro.

(C) Os pacotes podem custar o dobro na alta temporada.

(D) Os pacotes podem custar o, na alta temporada dobro.

(E) Os pacotes podem custar, na alta temporada, o dobro.

3. O **que**, utilizado em “...sem as chuvas **que** atrapalham a vida dos turistas entre novembro e abril.”(linhas 2/3), apresenta valor sintático de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) agente da passiva.
- (E) aposto.

4. O único vocábulo que, sem alterar o sentido da frase, **não** substitui o conector **pois**, que aparece em “...pois eles se reúnem em torno das lagoas.”(linhas 4/5), é

- (A) posto que.
- (B) porque.
- (C) já que.
- (D) visto que.
- (E) desde que.

5. De acordo com o texto, podemos afirmar que:

I. O autor aponta várias opções de diversão ao turista que visita o Pantanal.

II. O núcleo do SN “Diferentes regiões do Pantanal...” é o vocábulo **Pantanal**.

III. A oração “Maio e junho ainda são considerados meses de baixa temporada.”, foi escrita na voz passiva.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e III estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas I está correta.
- (E) I, II e III estão corretas.

6. A expressão que possui o mesmo valor sintático de “...a vida dos turistas...”, que foi usada no primeiro parágrafo, é:

- (A) “O período de seca...” (linhas 6/7)
- (B) “Na alta temporada...” (linha 11)
- (C) “Além de caminhadas...” (linha 12)
- (D) “O Pantanal Norte...” (linha 16)
- (E) “...boa estrutura de passeios e hospedagem.” (linhas 21/22)

UTILIZE O TEXTO II PARA RESPONDER AS
QUESTÕES DE 7 A 10.

Texto II

MÃOS DADAS

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista
da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por
serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os
homens presentes,
a vida presente.

Carlos Drummond de Andrade

7. De acordo com o texto, o autor sente-se:

- (A) importante por ser poeta.
- (B) diferente dos outros homens porque sabe fazer poesia.
- (C) um homem normal no meio de outros homens.
- (D) um ser superior em consequência da sua poesia.
- (E) um homem que, por ser poeta, não se preocupa com o seu semelhante.

8. Na primeira estrofe, os versos que melhor comprovam a preocupação do autor com o hoje é:

- (A) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Também não cantarei o mundo futuro.
- (B) Também não cantarei o mundo futuro./ Estou preso à vida e olho meus companheiros.
- (C) Também não cantarei o mundo futuro./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
- (D) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
- (E) Não serei o poeta de um mundo caduco./ Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

9. De acordo com o texto, quais os versos que comprovam que o mundo atual é muito grande e cheio de obstáculos e, em consequência disto, as pessoas devem se unir para vencer esses obstáculos?

- (A) Também não cantarei o mundo futuro./Estou preso à vida e olho meus companheiros.
- (B) O presente é tão grande, não nos afastemos./Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
- (C) O presente é tão grande, não nos afastemos./ Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
- (D) Estou preso à vida e olho meus companheiros./ Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
- (E) O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,/ a vida presente.

10. Além da função poética que permeia todo o texto, que outra função da linguagem nele predomina?

- (A) Metalingüística.
- (B) Referencial ou Informativa.
- (C) Emotiva ou Expressiva.
- (D) Conativa ou Apelativa.
- (E) Fática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O corticóide inibe a cascata do ácido araquidônico pelo bloqueio do (a):

- (A) tromboxano A2.
- (B) fosfolipase A2.
- (C) leucotrieno.
- (D) plasmina tromboplásica.
- (E) prostaglandina.

12. Com relação à técnica coroa-ápice, é correto afirmar que:

(A) a técnica não elimina as constrições nas regiões coronárias dos canais, aumentando o efeito das curvaturas dos canais.

(B) a técnica não fornece ao clínico uma percepção tátil completa durante a limpeza e modelagem da região apical.

(C) há uma probabilidade menor de alteração do comprimento de trabalho durante a instrumentação apical, uma vez que a curvatura do canal foi reduzida antes do real comprimento de trabalho.

(D) a técnica não remove os microrganismos infectantes antes da abordagem ao terço apical e com isso aumenta o risco de empurrar os irritantes pulpares ou microrganismos para as regiões periapicais.

(E) A região coronária do canal é limpa e modelada na etapa final, após a instrumentação da região apical ter sido limpa, modelada e desinfetada.

13. Com relação à adesão aos tecidos dentários, é correto afirmar que:

(A) a tensão superficial do adesivo deve ser sempre menor que a energia de superfície do esmalte ou da dentina.

(B) quanto maior o ângulo de contato, maior a molhabilidade do adesivo.

(C) a contaminação da superfície do esmalte ou da dentina aumenta a energia do mesmo, causando uma molhabilidade mais efetiva.

(D) ainda que a energia livre da superfície do esmalte ou da dentina possa ser menor que a tensão superficial do adesivo, a contração de polimerização pode também impedir a adesão.

(E) a contração de polimerização não afeta a adesão das resinas compostas com a superfície do esmalte ou da dentina.

14. Que complicação local ocorre, quando se introduz a solução anestésica na cápsula da parótida?

(A) Lesão dos tecidos moles.

(B) Trismo.

(C) Parestesia.

(D) Hematoma.

(E) Paralisia do nervo facial.

15. Paciente do sexo feminino com 5 anos de idade necessita submeter-se à extração do elemento dentário 61, devido a um traumatismo dento-

alveolar. A criança é portadora de cardiopatia congênita cianótica, sendo alérgica à penicilina. O cirurgião dentista deve:

(A) prescrever amoxicilina-50mg/kg, via oral, 1 hora antes da cirurgia.

(B) prescrever clindamicina-50mg/kg, via oral, 1 hora antes da cirurgia.

(C) prescrever amoxicilina-2g/kg, via oral, 1 hora antes da cirurgia.

(D) prescrever clindamicina-20mg/kg, via oral, 1 hora antes da cirurgia.

(E) prescrever ampicilina-50mg/kg, via intramuscular ou endovenosa, 30 minutos antes da cirurgia.

16. Com relação à anestesia por bloqueio regional é correto afirmar que:

(A) não se faz anestesia por bloqueio regional no consultório odontológico, somente em centros cirúrgicos.

(B) a anestesia por bloqueio regional é preferida sempre que for necessário tratar somente um único dente.

(C) a anestesia por bloqueio regional causa mais perfurações no tecido, aumentando a probabilidade de problemas após a injeção.

(D) a solução do anestésico local é infiltrada próximo às terminações nervosas.

(E) as injeções nos nervos alveolar superior, alveolar inferior são exemplos de bloqueio regional.

17. Na exodontia do primeiro molar superior, os ramos dos nervos maxilares que deverão ser anestesiados são:

(A) alveolar superior posterior; alveolar superior médio e palatino maior.

(B) alveolar superior posterior; nasopalatino e palatino menor.

(C) alveolar superior posterior; alveolar superior anterior e palatino maior.

(D) alveolar superior posterior e alveolar superior médio.

(E) alveolar superior posterior e palatino maior.

18. Um paciente com 65 anos de idade necessita realizar a exodontia do elemento dentário 33, que se encontra hígido, para a confecção de uma prótese total. Clinicamente, a mandíbula apresenta-se fina e

atrófica. A avulsão deste dente deve ser realizada com o uso de:

- (A) cinzéis e extratores.
- (B) cinzéis e fórceps.
- (C) brocas e extratores.
- (D) somente extratores.
- (E) brocas e fórceps.

19. Paciente de 19 anos de idade queixa-se de dor aguda localizada e provocada, que passa logo após a remoção do estímulo no elemento dentário 45. Os exames revelam cárie recidivante. Não há exposição pulpar. Não houve dor à percussão. Qual o provável diagnóstico?

- (A) Pulpite irreversível sintomática.
- (B) Periodontite apical aguda.
- (C) Abscesso perirradicular agudo.
- (D) Abscesso perirradicular crônico.
- (E) Pulpite reversível.

20. De acordo com os tópicos abaixo, a alternativa correta é:

- (A) Os cimentos ionômeros de vidro quimicamente ativados necessitam de um pré-tratamento da dentina com o ácido fosfórico para aumentar sua adesão à estrutura dentária.
- (B) Os cimentos ionômeros de vidro quimicamente ativados liberam menos flúor que os cimentos ionômeros de vidro modificados por resina.
- (C) Os compômeros sofrem sinérese por uma semana, devendo ser protegidos com verniz após os procedimentos de acabamento e polimento.
- (D) Os cimentos ionômeros de vidro reforçados com particular de prata apresentam maior resistência, radiopacidade e menor liberação de flúor.
- (E) Os cimentos ionômeros de vidro estão indicados para restaurações de classe I e II em dentes permanentes.

21. Paciente com 15 anos de idade apresenta lesão de cárie classe V no elemento dentário 25 com a margem cervical ligeiramente subgingival. A alternativa que possui a extensão do isolamento

absoluto e os grampos a serem utilizados, respectivamente, é:

- (A) do canino (13) ao molar (27); grampo 26 no elemento 27, 212 no elemento 25 e 211 no elemento 13.
- (B) do molar (27) ao pré-molar (24); grampo 26 no elemento 27, W8A no elemento 25 e 206 no elemento 24.
- (C) do canino (13) ao molar (27); grampo 26 no elemento 27 e 211 no elemento 13.
- (D) do molar (17) ao pré-molar (25); grampo 26 no elemento 17 e 206 no elemento 25.
- (E) do canino (13) ao pré-molar (25); grampo 211 no elemento 13 e 209 no elemento 25.

22. Sobre as restaurações anteriores e posteriores, pode-se afirmar que:

- (A) em restaurações de amálgama classe II, as ligas de particular esféricas permitem uma maior facilidade na obtenção do ponto de contato.
- (B) as resinas microhíbridas são empregadas para reproduzir o esmalte, devido as suas características de lisura, brilho e transparências.
- (C) os ângulos diedros do 2º grupo devem permanecer definidos e o ângulo cavo-superficial biselado em uma cavidade classe I oclusal para amálgama.
- (D) em preparos cavitários de classe V para resinas compostas, só realizamos o bisel do ângulo cavo-superficial nas margens de esmalte.
- (E) para as cavidades de classe II, utilizamos as resinas compostas micropartículas.

23. Que tipo de problema a pérola de esmalte pode causar ao paciente?

- (A) Hipercementose.
- (B) Bolsa periodontal.
- (C) Pápulas.
- (D) Leucoplasia.
- (E) Sialolitíase.

24. Quais as doenças obstrutivas que se instalam nas glândulas salivares?

- (A) Rânula, mucocele, sialolitíase.
- (B) Lúpus eritematoso, líquen plano.
- (C) Pênfigo vulgar, nevo branco.
- (D) Queilite actínica, cisto gengival erupcional.
- (E) Fibroma, estomatite aftosa.

25. Úlceras semelhante a morangos, afetando o palato, gengiva e mucosa alveolar, são manifestações clínicas da doença fúngica:

- (A) candidíase eritematosa.

- (B) blastomicose.
- (C) paracoccidioidomicose.
- (D) histoplasmose.
- (E) candidíase crônica.

26. As infecções virais que apresentam manifestações orais são:

- (A) epidermólise bolhosa; penfigoide cicatricial; doença das mãos-pés e boca.
- (B) noma; papiloma escamoso oral; condroma.
- (C) sífilis; varicela; macroquelia.
- (D) queilite glandular; xeroderma pigmentoso.
- (E) herpes zoster; mononucleose infecciosa; citomegalovírus; doença das mãos-pés e boca.

27. São processos proliferativos:

- (A) hemangioma e osteoma.
- (B) granuloma piogênico e lesão periférica de células gigantes.
- (C) osteossarcoma e fibromatose gengival irritativa.
- (D) adenoma pleomórfico e papiloma escamoso oral.
- (E) fibroma ossificante periféricos e hiperplasia fibrosa inflamatória.

28. Com relação aos princípios oclusais em dentística restauradora, A alternativa correta é:

- (A) Verificar se no movimento protrusivo e de lateralidade ao dente, após restaurado, não interfere nas respectivas guias de desocclusão.
- (B) Não se deve observar após a restauração os lados de trabalho e balanceio.
- (C) Deve-se, sempre que possível, estabelecer contatos oclusais na interface dente/restauração.
- (D) Permitir que o contato fique “alto” na máxima intercuspidação habitual.
- (E) Uma vez diagnosticado o contato prematuro após a restauração, está contra-indicado o ajuste oclusal à restauração.

29. Sobre as restaurações de amálgama, é correto afirmar que:

(A) na parede gengival, o uso de cinzeis, além de eliminar prismas de esmalte sem apoio que ficaram após o preparo cavitário, permite arredondar os ângulos gengivo-vestibular e gengivo-lingual.

(B) o acabamento e polimento deverão ser feitos antes das 24 horas, para permitir que o material apresente um grau avançado da reação de cristalização.

(C) após a escultura, deve ser realizada a brunidura com o movimento do centro da restauração para o dente. Esta etapa tem como objetivo diminuir a porosidade do amálgama, melhorar a adaptação marginal e proporcionar uma superfície mais lisa.

(D) após a trituração, o amálgama deve apresentar um aspecto plástico e granuloso, evidenciando, assim, uma correta trituração e homogeneização do material.

(E) na restauração de classe II, deve-se iniciar a condensação na caixa proximal, com um condensador de grande diâmetro e, à medida que for preenchendo a cavidade no sentido oclusal, trocá-lo por um menor.

30. Com relação às características da oclusão na dentição decídua. É correto afirmar que:

(A) os incisivos são mais vestibularizados, com um aumento dos trespasses vertical e horizontal.

(B) durante o início da dentição decídua, a articulação têmporo-mandibular se localiza em uma posição mais vertical com uma angulação mais reta.

(C) a articulação dentária só inicia com a erupção dos primeiros molares permanentes.

(D) não apresenta curva de Spee e Wilson.

(E) não apresenta “espaços primatas”.

